



Diese Patienten-Erinnerungskarte zum Risiko des Auftretens von schwerwiegenden Infektionen bei der Anwendung von Kineret® (Anakinra), ist verpflichtender Teil der Zulassung, um sicher zu stellen, dass Patienten die besonderen Sicherheitsanforderungen kennen und berücksichtigen.

BEHANDLUNG MIT KINERET®

Name des Patienten:

Name der Betreuungsperson (bei Kindern):

Dosis des Patienten:

Name und Telefonnummer des Arztes:

Wichtige Sicherheitshinweise zum Still-Syndrom

Das Makrophagenaktivierungssyndrom (MAS) ist eine schwerwiegende Komplikation des Still-Syndroms. Unbehandelt kann MAS lebensbedrohlich sein. Das Risiko der Entwicklung eines MAS ist höher, wenn Sie an einer Infektion leiden oder wenn die Symptome Ihres Still-Syndroms nicht ausreichend unter Kontrolle sind. Symptome eines MAS sind beispielsweise anhaltendes hohes Fieber, Schwellungen der Lymphknoten und anhaltender Hautausschlag.

Kineret® (Anakinra) kann das Risiko für eine schwerwiegende Infektion erhöhen. Die Symptome können anhaltendes hohes Fieber, Frösteln, Husten, Kopfschmerzen sowie Rötung und Schmerzempfindlichkeit der Haut sein. Auch anhaltendes niedriges Fieber, Gewichtsverlust und anhaltender Husten können Anzeichen einer Infektion sein.

Sollte es bei Ihnen zu Anzeichen einer Infektion oder einer Verschlimmerung der Symptome Ihres Still-Syndroms kommen, wenden Sie sich so schnell wie möglich an Ihren Arzt.